

遇交警查车,醉汉司机撒腿就跑

车里藏4个醉汉,一人还吸毒了



经检测,车上4名乘客都已饮酒。(图由民警拍摄)

本报4月14日讯(记者 杨玉龙) “像这种司机和乘客都喝大的,还真不多见。”东营高速交警支队民警介绍,13日晚,一辆轿车从东营南收费站驶下高速,正碰上交警在此执勤,让民警意外的是,轿车司机拉开门就向外逃跑!经检查,车上还坐着4个醉汉,其中一人还吸了毒!

“车还没驶下匝道,司机扔下车就跑了。”民警说,驾驶员突然的举动,让他们非常意外。4月13日晚10点半左右,一辆黑色帕萨特正从东营南收费站驶下高速,但车还没走到收费站,驾驶员就停车打开了车门,往高速公路外逃跑了。

执勤民警发现这一情况后立即上前检查,但逃跑的驾驶员已经不见身影。在检查这辆车时,民警发现车里还坐着4人,“里面酒气冲天,味道很大。”民警说,为了保障道路安全,执勤民警将车开下高速公路,经过检测,车上4人都已饮酒。不仅如此,据车上人反映,逃跑的驾驶员也饮酒了!

“这可是高速公路啊!路上这么多高速行驶的车,一个醉汉载着4个醉汉狂飙,实在太惊险!”民警说,饮酒后人体反应能力降低,车辆在高速行驶时,因采取措施不当,很容易引发事故。“这是在拿自己和乘客的生命开玩笑!”

还有更让民警意外的!按照规定,民警将该车暂扣,民警在登记车上物品时发现一个钱包,车上乘客于某称是他所有。“按规定,因驾驶员不在现场,钱包内财物也应一一登记。”可当民警打开钱包后,里面竟藏着一小包白色晶状体,“什么东西会被放在钱包里?当时就怀疑是毒品。”

随后,民警在现场又对4人做了唾液检测,于某的检测结果为阳性,在其尿检中,结果仍然显示为阳性。在这些证据面前,于某这才承认,这一小包正是其购买的冰毒。“因为涉毒,该案将移交派出所做进一步处理。”民警说,对逃走的驾驶员,交警还在追查中。

东营河口边防派出所创建平安渔港

本报4月14日讯(记者 任小杰 通讯员 冯平) 4月份以来,受强冷空气影响,东营市海域风浪较大,到国家一级渔港黄河口中心渔港停靠避风的船舶数量显著增加,来自河北、辽宁的外省船只数量也相比往年同期大幅增长。

针对渔港船只数量增加的情况,山东公安边防总队东营边防支队河口边防派出所加大了对避风船舶的管理力度,充分利用渔船民聚集避风的时机,对在中心渔港停靠的船舶进行清查。期间,民警通过查看船舶户口簿、船舶进出港签关簿、出海船民证等证件对所有船只进行摸底并作了详细登记。

在检查船舶的同时,民警借机为每艘船上的渔船民发

放了服务卡和宣传资料,并向他们介绍与渔船生产密切相关的法律法规,在营造安全稳定的生产作业环境的同时更好地服务进出港的渔船民,随后,河口边防派出所组织渔船民组织召开渔船民教育大会,结合典型案例,宣传海上渔业生产及海上治安方面的法律法规,增强渔船民的法律意识。

同时,为了应对渔船民大量涌入给港区带来的治安压力,河口边防派出所精心部署,积极开展“高密度、无死角”夜间专项清查行动,采取循环检查、不定期抽查等形式,排查港区安全隐患,并在群众中设置治安联络员,随时留意港区治安状况,有效提升了协同配合和快速反应能力,切实提高流动人口激增情况下的治安管控能力。

面部两侧长了肿块

原来得了米库利奇病

本报4月14日讯(记者 吕增霞 通讯员 于霞 刘广源) 家住广饶的高女士,今年60岁,4年前无意间发现左侧面部长了一肿块,口服消炎药后症状并无缓解,但肿块一直呈进行性增大,由于无疼痛和不适感,一直未到医院求诊。两年前海女士发觉右侧面部也长了一肿块,并有渐大趋势,为明确诊断来到东营市第二人民医院口腔科求诊。

通过询问病史了解到患者自发病以来,口干、眼干症状明显,两年前曾因眼部肿胀于某院行左侧泪腺摘除术。腮腺触诊发现双侧腮腺前缘各有一个肿块,左侧较大,约3cm×2.5cm,表面光滑,质地坚韧,边界清晰,固定且无触痛感;腮腺导管口不红肿,挤压腺体未见清亮分泌物。腮腺彩超检查示:双侧腮腺内有实性占位;CT平扫示两侧腮腺均呈弥漫性增大。影像科杨友德副主任医师会诊后初步诊断为米库利奇病。通过以上临床检查和辅助检查提示手术探查腮腺内实性肿块是明确诊断的唯一手段,遂收入院治疗。

入院后,积极完善各种术前检查和准备,排除手术禁忌,及时为患者做了手术。手术过程顺利,术中快速病理及术后常规病理均示肿块系慢性炎症增生组织,结合病史和术前检查结果患者罹患的是一种名为米库利奇病的罕见自身免疫性疾病。该病病因不明,临床表现以对称性泪腺、腮腺、颌下腺肿大多见并伴有口干、眼干症状,组织学特点表现为肿大的腺体中有大量的单核细胞浸润。早期认为米库利奇病为舍格伦综合征(干燥综合征)的一种,然而随着研究的深入,发现两者之间存在诸多不同之处:前者男性、女性均可发病,而后者则多见于女性;尽管前者有显著的泪腺、唾液腺肿胀,但口干、眼干的症状相对后者轻;前者病程中合并较多的并发症,可累及多种器官及组织,包括唾液腺、泪腺、胰腺、肾脏、腹膜后组织、淋巴结等,临床症状相对较轻,主要取决于受累器官或组织的局部压迫及受累腺体功能障碍程度。

目前米库利奇病的治疗以使用激素和免疫抑制类药物治疗为主,手术切除后作病理是帮助该疾病诊断的有效方法。